

МИОМЕКС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ

Содержание одной таблетки:

активные вещества:

Экстракт зеленого чая 16,7% катехины 650 мг,
Индол-3-карбинол 100 мг,

вспомогательные вещества: фосфаты кальция E341, карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль трехмерная, камедь целлюлозы E 468, целлюлоза E460, тальк E553b, магниевые соли жирных кислот E470b, диоксид кремния E551.

Свойства действующих веществ

Экстракт зелёного чая содержит катехины зелёного чая (эпигаллакто-3 катехины), характеризующиеся своими выраженными антиоксидантными свойствами, оказывающие позитивное влияние на обмен веществ, в том числе в женской половой сфере, препятствует активации факторов воспаления и пролиферации клеток эндометрия. Эпигаллокатехин-3-галлат зеленого чая приостанавливает образование и замедляет чрезмерный рост сосудов в миометрии, что предохраняет там развитие патологических процессов. Этим лимитируется рост опухолей, ингибируется инвазивная активность эндометриальных клеток. Эпигаллокатехин-3-галлат обладает противовоспалительным действием за счет влияния на ЦОГ-2, простагландины.

Индол-3 карбинол это биологически активное фитохимическое вещество получаемое из капусты брокколи, редиса, редьки, цветной, брюссельской и белокочанной капусты. Основные его эффекты связаны с влиянием на иммунную систему, работу печени, обмен эстрогенов участвует в процессе формирования клеток. Он блокирует деление измененных(вирус-инфицированных) клеток слизистой оболочки шейки матки и вызывает их целенаправленную гибель, не затрагивая при этом здоровые клетки организма.

Область применения:

Биологически активная добавка Миомекс, является негормональным фактором из растительных веществ, способствующий нормализации метаболизма женских половых гормонов. Биодобавка рекомендуется для улучшения обмена веществ и общего функционального состояния организма женщины, нормализации баланса женских половых гормонов, оказывая корректирующее действие на их уровень.

При применении Миомекс отмечено снижение риска функциональных расстройств как:

- предменструальный синдром эндометриоза;
- миома матки и гиперплазия молочной железы.

Основной механизм оздоравливающего действия препарата заключается в его выраженной антиэстрогенной активности. Миомекс подавляет рост эстроген зависимых и эстроген- независимых опухолей женской репродуктивной системы, нейтрализует действие ростовых факторов стимулирующих развитие опухолей молочных желез. В качестве вспомогательного средства в традиционном лечении пациентов при таких заболеваниях, как мастопатия, дисплазии яичников, фибромиомы матки, миома матки, эндометриоз, остроконечные кондиломы, вирус папилломы человека папилломатоз органов женской половой системы, предменструальный синдром.

Способ применения:

Перорально. Женщинам по 2 таблетки во время приема пищи, 2 раза в день или по рекомендации врача.

Мастопатия:

по 1 таблетке 3 раза в день. Длительность курса лечения 3- месяца.

Гиперплазия эндометрия, миома матки и эндометриоз:

по 2 таблетки 3 раза в день. Продолжительность 6 месяцев.

Вирус папилломы человека:

по 2 таблетки 3 раза в день. Продолжительность 3 месяца.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД

Лица, принимающие препараты, снижающие кислотность желудочного сока.

Беременность и период лактации.

Особые указания: не следует превышать рекомендуемую суточную дозу.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска:

По 10 таблеток помещаются в блистер.

По 6 блистеров, вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках вкладываются в картонную упаковку.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

2 года.

Не принимать после истечения срока годности.

Владелец Сертификата:

Spey Medical Ltd.,

Лондон, Великобритания

Производитель:

“SENSILAB Polska Sp.z o.o.” S.K.A.

ул. Ген. Мариана Лангиевица 58, 95-050 Константынув-Лудзки,

Польша

Организация уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Узбекистана:

ООО «Ameliya Pharm Service»

ул. Ойбек 36, БЦ «East Line», 100015,

г. Ташкент, Узбекистан

тел: +998 781505082,

e-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk

МИОМЕКС

БИОЛОГИК ФАОЛ ҚЎШИМЧАНИ
ҚўЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

Бир таблетка куйидагиларни сақлайди:

фаол моддалар:

Кўк чой экстракти 16,7% катехина 650 мг,
Индол-3-карбинол 100 мг,

ёрдамчи моддалар: кальций фосфати E341, уч ўлчамли карбоксиметилцеллюлоза натрий тузи, целлюлоза муми E468, целлюлоза E460, тальк E553b, ёғли кислоталарнинг магний тузлари E470b, кремний диоксиди E551.

Таъсир этувчи моддаларнинг хусусиятлари

Кўк чой экстракти моддалар алмашинувига, жумладан аёлларнинг жинсий соҳасига, ижобий таъсир кўрсатадиган, ўзининг яққол кўринишга эга бўлган антиоксидант хусусиятлари билан таснифланувчи кўк чой катехинини (эпигаллакто-3 катехина) сақлайди, эндометрия хужайраларининг яллигланиши ва пролиферацияси омилларининг фаоллашишига тўсқинлик қилади. Кўк чойнинг эпигаллокатехин-3-галлати миометрияда томирларнинг ҳосил бўлишини ва уларнинг ҳаддан зиёд ўсишини секинлаштиради, бу у ерда патологик жараёнларнинг ривожланишидан сақлаб туради. Шу билан ўсmalarнинг ўсишини чеклайди, эндометриал хужайраларнинг инвазив фаоллигини ингибиция қилади. Эпигаллокатехин-3-галлати ЦОГ-2, простогландинларга таъсир этиши ҳисобига яллигланишга қарши таъсирга эга.

Индол-3 карбинол бу брокколи карами, редис, шолғом, рангли, брүсселлик ва оқ карамлардан олинган биологик фаол фитокимёвий моддадир. Унинг асосий самаралари иммун тизимга, жигарнинг ишига, эстрогенлар алмашинувига таъсир билан боғлиқ, хужайраларни шакллантириш жараёнида иштирок этади. У бачадон бўйинчасининг шиллиқ қаватини ўзгартирилган хужайраларининг (вирус-инфекцияланган) бўлинишини блоклайди ва бунда организмнинг соғлом хужайраларига таъсир этмасдан уларнинг мақсадли йўналтирилган нобуд бўлишини чақиради.

Қўлланилиши:

Миомекс биологик фаол қўшимча, аёллар жинсий гормонларининг метаболизмига ёрдам берувчи ўсимлик моддаларидан ногормонал омил ҳисобланади.

Биоқўшимча аёлнинг организмда моддалар алмашинуви ва унинг умумий функционал ҳолатини яхшилаш, аёллар жинсий гормонларининг даражасига тўғриловчи таъсир кўрсатиб, уларнинг мувозанатини меъёрлаштириш учун тавсия этилган.

Миомексни қўллаш вақтида куйидаги функционал бузилишларнинг хавфини пасайиши қайд этилган:

- эндометриоз ҳайздан олдинги синдром;
- бачадон миомаси ва сут безларининг гиперплазияси.

Препаратнинг соғломлаштирувчи таъсирини асосий механизми унинг яққол намоён бўлган антиэстроген фаоллигидан иборат. Миомекс аёллар репродуктив тизимнинг эстроген-тобе ва эстроген-тобе бўлмаган ўсmalarини ўсишини сусайтиради, сут безларининг ўсmalarини ривожланишини рағбатлантирувчи ўсиш омилларини таъсирини меъёрлаштиради. Тухумдонларнинг мастопатияси, дисплазияси, бачадон фибромиомалари, бачадон миомаси, ўткир учли кондилломанинг эндометриози, одам папилломаси вируси, аёллар жинсий тизими органларининг папилломатози, эндометриоз, ҳайздан аввални синдром каби касалликларда пациентларни анъанавий даволашда ёрдамчи восита сифатида қўлланилади.

Қўллаш усули:

Перорал.

Аёлларга кунига 2 марта ёки шифокорнинг тавсияси бўйича овқат қабул қилиш вақтида 2 таблеткадан.

Мастопатия:

кунига 3 марта 1 таблеткадан. Даволаш курсининг давомийлиги 3 ой.

Гиперплазия эндометрия, бачадон миомаси ва эндометриоз:

кунига 3 марта 2 таблеткадан. Давомийлиги 6 ой.

Одам папилломаси вируси:

кунига 3 марта 2 таблеткадан. Давомийлиги 3 ой.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар:

БФҚнинг компонентларини шахсий кўтараолмаслик.

Меъда шираси кислоталигини пасайтирувчи препаратларни қабул қилувчи шахслар. Ҳомиладорлик ва лактация даври.

Махсус кўрсатмалар:

Тавсия этилувчи дозани ошириш керак эмас.

Қўллашдан аввал шифокор билан маслаҳатлашиш тавсия этилади.

Чиқарилиш шакли:

10 таблеткадан блистерга жойлаштирилади.

6 блистердан, картон қадоққа давлат ва рус тилларидаги қўлланилишга доир йўриқнома билан биргаликда.

Сақлаш шароити:

25°Сдан юқори бўлмаган ҳароратда қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда сақлансин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин!

Яроқлилик муддати:

2 йил.

Яроқлилик муддати яқунлангандан кейин қабул қилинмасин.

Сертификат эгаси:

Sprey Medical Ltd.,

Лондон, Буюк Британия

Ишлаб чиқарувчи:

“SENSILAB Polska Sp.z.o.o.” S.K.A.

Ген. Мариан Лангиевиц кўч. 58, 95-050 Константынув-Лудзки,

Польша

Ўзбекистон ҳудудида истеъмолчилардан эътирозларни қабул қилувчи ваколатланган ташкилот:

«Ameliya Pharm Service» МЧЖ

Ойбек кўч. 36, «East Line» БМ, 100015,

Тошкент ш., Ўзбекистон

тел: +998 781505082,

e-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk