

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Торговое название препарата:

Лилайз Роза

Действующее вещество (МНН):

гиалуроновая кислота

Лекарственная форма:

суппозитории вагинальные

Состав:

Каждый суппозиторий содержит:

Натрия гиалуронат (эквивалентно гиалуроновой кислоте 5 мг)	5,90 мг
Massa supposito A (твердый жир)	1847,70 мг
Масляный экстракт центеллы азиатской	20,00 мг
Жирорастворимый экстракт алоэ	60,00 мг
Масляный экстракт календулы	60,00 мг
Эфирное масло чайного дерева	2,00 мг
Бутилированный гидрокситолуол (БНТ)	0,40 мг
Пропилпарагидроксибензоат	1,00 мг
Изобутилпарагидроксибензоат	1,00 мг
Бутилпарагидроксибензоат	2,00 мг

Описание:

белые или почти белые суппозитории без запаха.

Фармакотерапевтическая группа:

Стимулятор трофики тканей и регенерации.

Код АТХ: D03AX05

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Механизм действия

Способствует быстрой регенерации и реформированию слизистой оболочки влагалища. Гиалуроновая кислота представляет собой мукополисахаридный натуральный полимер, который является важным интерстициальным компонентом соединительной ткани. Её физико-химические свойства способствуют взаимодействию с другими молекулами и клетками, что делает присутствие гиалуроновой кислоты исключительно важным в ряде биологических процессов. Гиалуроновая кислота образует с молекулами воды дисперсионный матрикс, который играет важную роль в поддержании тонуса кожи и её эластичности. С другими молекулами протеогликанов, гиалуроновая кислота стабилизирует межклеточную массу соединительной ткани. Физико-химические свойства гиалуроновой кислоты в области раны создают физиологические условия, способствующие её заживлению.

Показания к применению

- атрофический вагинит;
- улучшение процессов регенерации в послеродовом периоде;
- после проведения хирургических операций во влагалище;
- после криодеструкции;
- при дистрофических изменениях, после лучевого лечения;
- при атрофических явлениях после гистеро- и овариоэктомии, а также длительном приеме кортикостероидов и оральных контрацептивов.

Способ применения и дозы

Вагинально. Продолжительность применения обычно составляет 30 дней, но может быть продлена в соответствии с указаниями врача. Перед введением необходимо вымыть руки, освободить вагинальные суппозитории (разрезав ножницами упаковку). Вводить вагинальные суппозитории глубоко во влагалище. Если вагинальные суппозитории слишком мягкие, необходимо предварительно охладить их в холодильнике в течение нескольких минут или подержать под холодной водой (до извлечения их из пластиковой упаковки). Обычная дозировка составляет один вагинальный суппозиторий в день, вечером перед сном (или согласно указаниям врача).

Нельзя принимать внутрь.

Побочные действия

Серьезные побочные эффекты не отмечались.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- злокачественные новообразования.

Лекарственные взаимодействия

Не изучалось.

Особые указания

Длительное применение средства, предназначенного для местного использования, может вызвать симптомы гиперчувствительности, в этом случае необходимо прекратить применение и проконсультироваться с врачом. Не глотать! Избегать контакта с глазами!

Применение при беременности и период лактации

При беременности проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлению автотранспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Передозировка

Не изучалось.

Форма выпуска

По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлорида и полиэтилена.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец торговой марки и регистрационного удостоверения

Spey Medical Ltd., Великобритания

Производитель

HELP S.A., Греция

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ООО "Ameliya Pharm Service",
 Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент, ул. Ойбек, 36,
 Тел: +99871 150-50-81, 150-50-82
 E-mail: ameliyapharm@gmail.com

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА

Препаратнинг савдо номи:
Лилайз Роза

Таъсир этувчи модда (ХПН):
гиалурон кислотаси

Дори шакли:
вагинал суппозиторийлар

Таркиби:

Ҳар бир суппозиторий қўйдагиларни сақлайди:

Натрий гиалуронати (гиалуроник кислотага эквивалент 5 мг)	5,90 мг
Massa suppositoie A (қаттиқ ёр)	1847,70 мг
Осиё центелласи мойли экстракти	20,00 мг
Мой эритмали алоэ экстракти	60,00 мг
Календула мой экстракти	60,00 мг
Чой дарахти мой экстракти	2,00 мг
Бутилланган гидрокситолуол (БНТ)	0,40 мг
Пропилпарагидроксибензоат	1,00 мг
Изобутилпарагидроксибензоат	1,00 мг
Бутилпарагидроксибензоат	2,00 мг

Таърифи:

оқ ёки деярли оқ хидсиз суппозиторийлар.

Фармакотерапевтик гуруҳи:

Тўқималарнинг трофизми ва регенерациясини
стимулятори.

Код АТХ: D03AX05

Фармакологик хусусиятлари

Фармакодинамикаси

Таъсир механизми

Қиннинг шиллик пардасининг тез тикланишига ва ўзгаришига ёрдам беради. Гиалуроник кислота мукополисахаридли табиий полимердир. Полимер бириктирувчи тўқиманинг муҳим интерстициал таркибий қисми саналади. Унинг физик ва кимёвий хоссалари бошқа молекулалар ва хужайралар билан таъсирни қўллаб-қувватлайди, бу эса биологик жараёнлар қаторида гиалуроник кислотанинг иштирокини ўта муҳимлаштиради. Гиалуроник кислота сувнинг молекулалари билан бирга тери фаоллиги ва унинг эластиклигини сақлашда муҳим ўрин тутадиган дисперсион матриксни ҳосил қилади. Протеогликанларнинг молекулалари билан бирга гиалуроник кислота бириктирувчи тўқиманинг хужайралараро массасини барқарорлаштиради. Жароҳат атрофида гиалуроник кислотанинг физик ва кимёвий хоссалари жароҳатнинг битишига ёрдам берадиган физиологик шароитларни ҳосил қилади.

Қўлланилиши

- атрофик вагинит;
- туғишдан кейинги даврда регенерация жараёнларининг яхшиланиши;
- қинда жарроҳлик операциялари ўтказилгандан кейин;
- криодеструкциядан кейин;
- нурли даволанишдан кейинги дистрофик ўзгаришларда;
- гистеро- ва овариозектомиядан кейинги атрофик ҳолатларда, шунингдек кортикостероидлар ва орал контрацептивлар узоқ вақт қабул қилинганда қўлланилади.

Қўллаш усули ва дозалари

Вагинал. Қўллаш муддати одатда 30 кунни ташкил қилади, аммо шифокорнинг кўрсатмаларига биноан узайтирилиши мумкин. Препаратни юборишдан олдин қўлни яхшилаб ювинг, вагинал суппозиторийни чиқаринг (ўрамни қайчи билан кесган ҳолда). Вагинал суппозиторийни қин ичига чуқур киритинг. Вагинал суппозиторийлар жуда юмшоқ бўлиб қолган бўлса, бир неча дақиқа давомда музлаткичга солиб қўйинг ёки совуқ сувда тутиб туринг (пластик ўрамдан олишдан аввал). Вагинал суппозиторийнинг одатий дозаси кечкурунги уйку олдидан (ёки шифокор кўрсатмасига биноан) кунига 1 марта. Ичга қабул қилинмасин.

Ножўя таъсирлар

Препаратнинг ҳеч қандай ножўя таъсирлари қайд этилмаган.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

- препарат таркибий қисмларига юқори сезувчанлик;
- хавфли ўсмада қўллаш мумкин эмас.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Ўрнатилмаган.

Махсус кўрсатмалар

Маҳалий ишлатиш учун мўлжалланган воситадан узоқ муддат фойдаланиш гиперсезувчанлик белгиларига сабаб бўлиши мумкин, ушбу ҳолатда қўлланилишини тўхтатиб, шифокор билан маслаҳатлашиш лозим. Ютилмасин! Кўзга тушишдан сақланинг!

Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланилиши

Ҳомиладорлик пайтида қабул қилишга тўғри келганда, шифокор билан маслаҳатлашинг.

Автотранспортни ҳайдаш ва механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Препарат автотранспорт воситасини ёки потенциал хавфли механизмларни бошқариш қобилиятига таъсир қилмайди.

Дозани ошириб юборилиши

Ўрнатилмаган.

Чиқарилиш шакли

5 та суппозиторийлардан поливинилхлориддан ва полиэтилендан контур уяли ўрамда.

2 та контур уяли ўрамдан давлат ва рус тиллардаги тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга картон қутига жойлаштирилади.

Сақлаш шароитлари

Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин!

Яроқлилик муддати

3 йил.

Яроқлилик муддати ўтгандан сўнг қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Савдо маркази ва рўйхатдан ўтказилганлик

гуювономаси эгаси

Sprey Medical Ltd., Буюк Британия

Ишлаб чиқарувчи

HELP S.A., Греция

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тиббий

маҳсулотни сифати бўйича эътирозлар (таклифлар)

ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили

"Ameliya Pharm Service" МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, 100015, Тошкент ш.,

Ойбек кўч., 36

Тел: +998 71 150 50 81, 150 50 82

E-mail: ameliyapharm@gmail.com