

ТИБИЁТДА ҚўЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙўРИҚНОМА

Савдо номи: Герветин.

Халқаро патентланмаган номи: Бензидамин.

Дори шакли: маҳаллий қўллаш учун эритма.

Таркиби: 1 грамм эритма куйдагиларни сақлайди:
фаол модда: 1,5 мг бензидамин гидрохлориди.
ёрдамчи моддалар: метилпарагидроксibenзоат, глицерол,
этанол 96%, натрий сахаринат, натрий гидрокарбонат,
титансорбат 60, яллиз ароматизатори (суяк), хинолин сарик
бўвчиси 70 E (104), индиготин бўвчиси 85 E (132),
тозаланган сув.

Фармакотерапевтик гуруҳи: ЛОР-амалиёти ва
стоматологияда маҳаллий қўллаш учун НЯҚВ.
АТХ коди: A01AD02.

Фармакологик таъсири Фармакодинамикаси:

Бензидамин индазоллар гуруҳига мансуб бўлиб, ностероид
яллигланшига қарши препарат ҳисобланади. Препарат
яллигланшига қарши, оғриқсизлантирувчи, маҳаллий оғриқ
қолдирувчи ва кенг таъсир доирали микроорганизмларга
қарши антибактериал таъсир кўрсатади. Капиллярлар
ўтказувчанлигини камайтиради; ҳужайра мембранасини
барқарорлаштиради, АТФ ва оксидланши фосфорланши
жараёнларидаги бошқа макроэргик бирикмаларни ишлаб
чиқарилишини тормозлайди. Препаратнинг яллигланшига
қарши ва мембранани барқарорлаштирадиган таъсири
простатландинларни, гистаминни, брадикининни,
цитокининларни, комплемент омиллари ва бошқа
носпецифик шикастловчи омиллар синтезини тормозлаши
ва фаолсизлантириши билан боғлиқ. Оғриқсизлантирувчи
ва маҳаллий оғриқ қолдирувчи таъсири альгоген
хусусиятига эга бўлган биоген аминларнинг
концентрациясини билвосита камайтириши ва рецептор
аппаратнинг оғриқ бўсағаси сезувчанлигини ошириши
билан боғлиқ; бензидамин шунингдек тўқима рецепторлари
билан брадикининни ўзаро таъсирини блоклайди,
яллигланши ўчоғида қон айланишини қайта тиклайди ва
оғриқ сезувчанлигини камайтиради. Бензидамин
микроорганизмларнинг мембраналари орқали тез ўтиши
қобилияти туфайли антибактериал ва специфик
микробларга қарши таъсир намоян қилади ва
микроорганизм ҳужайраларидаги метаболлик жараёнларни
бузиб ва ҳужайра структурасини шикастлаб, ҳужайраинг
лизисини (парчаланишини) чақиради.
Препарат Candida Albicans га нисбатан замбуруғларга
қарши таъсирга эга. У ҳужайра деворини ва мицелларнинг
метаболлик занжирини структурали бузилишини чақириб,
замбуруғларнинг репродукциясига тўсқинлик қилади.
Препарат маҳаллий қўллашганда шиллиқ қаватлар орқали
яхши сўрилади ва яллигланган тўқималарга ўтади.
Бензидаминни бошқа химиотерапевтик препаратлар билан
даволаш схемасига киритиш даволашнинг
самарадорлигини аҳамиятли даражада оширади ва
даволаш муддатини қисқартиради.
Фармакокинетикаси:
Препарат маҳаллий қўллашганда шиллиқ қаватлар орқали
яхши сўрилади ва яллигланган тўқималарга ўтади.
Метаболитлар кўринишида буйрак орқали чиқарилади.

Қўлланилиши

Оғиз бўшлиғини ва ЛОР-аъзоларини яллигланши
касаликлари:
• гингивит, глоссит, стоматит (шу жумладан нур билан
даволаш ва химиотерапиядан кейин);
• ангина, фарингит, ларингит, тонзиллит;
• кандидоз (мажмуавий даволаш тарихида);
• сўлак безининг калькулёз яллигланши;
• жароҳлик аралашувлари ва жароҳатлардан (шу
жумладан тонзиллэктомия, жағларни синиши) кейин;
• тишларни даволаш ёки олиб ташлагандан кейин;
• пародонтоз;
• инфекион-яллигланши касалликларида мажмуавий
даволаш таркибида қўллаш лозим.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар:

• препаратнинг компонентларига юқори сезувчанлик;
• 12 ёшгача бўлган болалар ёшида қўллаш мумкин эмас.
Ҳомилдорлик ва эмизишда қўлланиши:
Препаратни ҳомилдорлик ва лактация (эмизиш) даврида
кўрсатмалар бўйича қўллаш мумкин

Қўллаш усули ва дозалари:

Маҳаллий қўллаш учун эритма: томоқни ёки оғизни чайиш
учун 15 мл препарат ҳар 1,5-3 соатда ишлатилади.
Чайишдан кейин эритмани туфлаб ташлаш керак.
Яллигланши жараёнларида чайиш учун суялтирилмаган
эритма ишлатилади, оғиз ва томоқни гигиеник чайиш учун
суялтирилган эритма (15 мл препарат ва 15 мл сув
аралаштирилади) ҳар куни ишлатилади. Препаратни ютиш
мумкин эмас!
Оғиз бўшлиғи ва ЛОР-аъзоларининг яллигланши
касаликларида (турли этиологияли): 4 кундан 15 кунгача;
Одонто-стоматологик патологияларда: 6 кундан 25
кунгача;
Жароҳлик аралашувлари ва жароҳатлардан кейин
(тонзиллэктомия, жағларни синиши): 4 кундан 7 кунгача.
Препарат узоқ муддат давомида қўллашганда, шифокор
билан маслаҳатлашиш лозим.

Ноҳў таъсири:

Маҳаллий реакциялар: оғизни қуриши, оғиз бўшлиғида
увишиш, ачишиш ҳисси.
Аллергик реакциялар: тери тошмаси.
Бошқалар: уйқучанлик.

Дозани ошириб юборилиши:

Ҳозирги вақтга қадар Герветин препаратини дозасини
ошириб юборилиш ҳолатлари тўғрисида хабар берилмаган.

Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсири:

Аниқланмаган.

Махсус кўрсатмалар:

Агар эритма қўллашганда ачишиш ҳисси пайдо бўлса, уни
дастлаб градириланган стаканчада сув даражасини
белгигача етказиш йўли билан, сув қўшиб суялтириш керак.
Кўзга тушишидан сақланиш керак. Препарат автомобилни
бошқариш қобилиятига ва юқори диққатни талаб қилувчи
бошқа фаолият турларига таъсир кўрсатмайди.

Чиқарилиш шакли ва ўрама:

Томоқ ва оғиз бўшлиғини чайиш учун эритма 100 г шиша
флакнда. Флакн тиббиётда қўллаш бўйича ўриқномаси
билан бирга картон ўрамда жойланади.

Сақлаш шароити:

Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, оригинал ўрамда
25°С дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.
Болалар ололмайдиган жойда сақлансин!

Яроқлилик муддати:

Ўрамда кўрсатилган.
Яроқлилик муддати ўтганидан кейин ишлатилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби:

Рецептсиз.

Савдо маркази ва рўйхатдан ўтаказилганлик

ғувоҳномасининг эгаси:

SPEY MEDICAL Ltd.,
Лондон, Буюк Британия

Ишлаб чиқарилган:

РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье
Скопье, Македония Республикаси

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори

воситаларининг сифати бўйича эътирозлар

(таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва

манзили

"Ameliya Pharm Service" МЧЖ,

ул. Ойбек 36, БЦ "East line", 100015, Ташкент.

тел: +998 71 15050581, 1505082